~~n° 29~~

anevrisme de la crosse de l'aorte   n.° 17.

~~tumeur~~ ajouté   par rupture

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

au mois de fevrier ou de mars de ~~cette~~ l'année derniere une demoiselle agée de 28 ans sentit, a la suite de plusieurs efforts violens, une douleur vers la clavicule gauche, un mois après cet accident elle apperçut vers cette partie une tumeur dont on ne put d'abord definir le caractere, la malade etoit alors dans l'embonpoint, mais a mesure que la tumeur s'accrut elle maigrit et tomba dans le marasme, la pulsation devint aussi sensible a mesure que le volume augmentoit, M. goubeli docteur

En medecine   de la faculté de paris vit la malade avec M.r de la faye presque tout le tems de son incommodité; une demie heure avant sa mort que je la vis pour la 1.ere fois le battement de la tumeur etoit aussi considerable que celuy du coeur dans l'etat le plus naturel quoique le pouls fut moribond.

La tumeur avoit pres de six pouces de diametre, on observoit sur le centre plusieurs taches livides qui auroient pu en imposer sans les pulsations.

M.r goubeli medecin de la malade ~~…~~ fit luy meme l'ouverture

Le 9 du present mois   du cadavre, M.r salin son confrere, M.r de la faye duclusseau, de bauve et moi etions presens. la tumeur fut separée du reste du corps, de l'interieur a l'exterieur, sa face posterieure portoit au centre une tache livide comme l'exterieure, il n'y avoit point de carie aux vertebres.

la figure de la tumeur etoit piriforme, dont la pointe tournée vers le coeur elle avoit ℥ß pouces de longueur, et 5 de diametre largeur mesuré a sa partie moyenne,

les origines des arteres souclavieres ne prouvoient aucun changement

la carotide gauche paroissoit naitre du pedicule de la tumeur son embouchure elargie, elle se continuoit ensuite sous la face posterieure de la tumeur.

ARC 54 n° 18

la carotide droit paroit ~~Ro~~ aussi naitre du pedicule de la tumeur
~~son sac ne correspondant point a la souclaviere du meme coté~~
mais toujours est commun avec la souclaviere
la tumeur fut ouverte par sa parois posterieure et la cavité s'est
trouvé double, une superieure ~~Externe~~ exterieure au thorax renfermant une
masse comme charnue et pasle qui n'etoit autre chose, qu'un amas de
couches limphatiques que l'on divisoit par lames, cette masse pesoit environ
2 livres
la cavité inferieure qui n'etoit pas si grande contenoit environ
une ~~tiers~~ demie livre de sang coagulé fort noir. ces deux cavites
etoient separées l'une de l'autre par la clavicule dont la portion sternale
etoit vermoulue, la premiere piece du sternum qui repondoit
aussi au dedans de la tumeur s'est aussi trouvée cariée a son bord
claviculaire,
La crosse de l'aorte fut ouverte par son bord concave, elle avoit
une ouverture fort large qui conduisoit dans le sac aneurismal.
le coeur fut ~~trouvé~~ jugé de son volume ordinaire mais plus pasle et plus
mou, il y avoit beaucoup d'eau dans le pericarde,
tout le sisteme veineux des trois capacités avoit acquis beaucoup plus
de volume que l'arteriel.
le poulmon gauche etoit malade et avoit plusieurs adherences a
la pleure,
le foie etoit tres volumineux ainsi que la rate,
les ovaires contenoient des hydatides surtout le droit qui etoit plus
enfoncé et au dedans duquel s'elevoit un hydatide assez grosse.
~~[illegible]~~ le 13 Janvier 1774. Allan